

صفحه 1

مرد ۴۸ ساله بعد از سقوط از ارتفاع در روز قبل به مرکز درمانی آورده شده است. در معاینه، نبض‌های دیستال اندام وجود دارد. درد شدید با **Passive toe extension** دارد، پارستزی فضای بین انگشت اول و دوم دارد.

فوتوگرافی و رادیوگرافی را ملاحظه نمایید:



بهترین اقدام درمانی اولیه چیست؟ (سه مورد)

متن ورودی

صفحه 2

مرد ۴۸ ساله بعد از سقوط از ارتفاع در روز قبل به مرکز درمانی آورده شده است. در معاینه نبض‌های دیستال اندام وجود دارد. درد شدید با **Passive toe extension** دارد، پارستزی فضای بین انگشت اول و دوم دارد

فوتوگرافی و رادیو گرافی ملاحظه نمایید.



حین آماده‌سازی بیمار، درد شدیدتر شده و کمپارتمان قدامی سفت است. بهترین اقدام کدام است؟

متن ورودی

صفحه 3

مرد ۴۸ ساله بعد از سقوط از ارتفاع در روز قبل به مرکز درمانی آورده شده است. در معاینه نبض‌های دیستال اندام وجود دارد. درد شدید با **Passive toe extension** دارد، پارستزی فضای بین انگشت اول و دوم دارد

فوتوگرافی و رادیو گرافی ملاحظه نمایید.



پس از دبریدمان مشخص می‌شود شکستگی در یک سوم دیستال تیبیا به سمت مچ کشیده شده باشد. برای برنامه‌ریزی **NAILING** چه تصویربرداری برای کامل‌تر کردن بررسی انجام می‌دهید؟ (دو مورد)

متن ورودی

صفحه 4

مرد ۴۸ ساله بعد از سقوط از ارتفاع در روز قبل به مرکز درمانی آورده شده است. در معاینه نبض‌های دیستال اندام وجود دارد. درد شدید با **Passive toe extension** دارد، پارستزی فضای بین انگشت اول و دوم دارد

فوتوگرافی و رادیو گرافی ملاحظه نمایید.



با مشخص شدن وجود **Posterior malleolar fracture** قبل از عبور Nail بهترین اقدام چیست؟

متن ورودی

صفحه 5

مرد ۴۸ ساله بعد از سقوط از ارتفاع در روز قبل به مرکز درمانی آورده شده است. در معاینه نبض‌های دیستال اندام وجود دارد. درد شدید با **Passive toe extension** دارد، پارستزی فضای بین انگشت اول و دوم دارد

فوتوگرافی و رادیو گرافی ملاحظه نمایید.



تحمل وزن روی اندام را چه زمانی شروع می‌کنید؟

متن ورودی