

داخلی اعصاب CSM

ساقه سوال:

آقای ۴۹ ساله دیابتیک تحت درمان با انسولین با ضعف تدریجی اندام‌های تحتانی- پارسیزی و اختلال اسفنکتری مراجعه نموده است. در معاینه اختلال حس عمقی ضعف در حد ۵/۴ و افزایش رفلکس‌ها در اندام‌های تحتانی مشهود می‌باشد. توسط یکی از همکاران درخواست ام‌آر‌آی نخاع و تست‌های زیر شده است که پاسخ آن را مشاهده می‌نمایید. اقدامات بعدی کدام است؟

CBC,LFT, TFT: Normal

MOG Ab : ELISA 1/128

B12 level : Normal

Anti aquaporin : Negative

نمای T2 و T1 با تزریق از MRI سرویکال بیمار را مشاهده می‌کنید.




سوال اول: اقدام بعدی شما کدام است؟


(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 11_ بیماری‌های مغز و اعصاب_PMP	مدت آزمون: 10
---------------------------------------	---------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
-------	---------	-------------	------------	-----

			انهانسمنت روییت نشد	
	0.00	0.00		MRI مغز با و بدون تزریق
	0.00	1.00-	انجام نگردید	HTLV1-2
	0.00	0.00	انجام نگردید	انجام VEP
	0.00	1.00-	انجام نگردید	تکرار Anti MOG (Elisa)
	0.00	1.00-	انجام نشد	تکرار Anti AQP4
	0.00	3.00-	انجام نشد	LP
	0.00	1.00-	انجام نگردید	Spinal cord Angiography
	0.00	0.00	250	FBS
	0.00	1.00-	انجام نگردید	EMG-NCV
	0.00	3.00	توصیه به جراحی	مشاوره جراحی اعصاب

ام آر ای مغزی بدون تزریق بیمار را مشاهده می کنید. در تصاویر با تزریق انهنسمنت دیده نمی شود.



همکار جراح اعصاب با تشخیص سرویکال اسپاندىلوتیک میلوپاتی توصیه به عمل جراحی نموده است.

سوال: اقدام بعدی شما چیست؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
پالس استروبیید پنج روزه با پروتکل انسولین	انجام نشد	1.00-	0.00	
چک مجدد MOG Ab با روش cell based	انجام نشد	1.00-	0.00	
شروع ریتوکسیماب و ادامه آن هر شش ماه	انجام نشد	2.00-	0.00	
پلاسما فرز با توجه به دیابت	انجام نشد	2.00-	0.00	
ارجاع بیمار جهت جراحی	جراح مشاوره بیهوشی درخواست داده و کاندید عمل نموده اند	3.00	0.00	
مشاوره مجدد با جراح اعصاب و توجه دادن به تست مثبت MOG	انجام نشد	1.00-	0.00	

سوال سوم: بیمار به پزشک دیگری مراجعه و در نهایت جراحی شده است. علیرغم عدم تشدید علائم بالینی در ام ار آی نخاع گردنی سه ماه پس از عمل کماکان ناحیه Enhancing در همان مقطع قبلی دیده می‌شود.

سوال: اقدام بعدی کدام است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
پالس استروبیید	انجام نشد	1.00-	0.00	
IV IG	انجام نشد	1.00-	0.00	
پلاسما فرز	انجام نشد	1.00-	0.00	
توانبخشی و پیگیری بیمار	کمک کننده است	3.00	0.00	
MR Angiography	انجام نشد	1.00-	0.00	
بررسی پارانتوپلاستیک	انجام نشد	1.00-	0.00	
پیشنهاد جراحی مجدد	انجام نشد	3.00-	0.00	