

نورپاتی حاد

آقای ۳۰ ساله با سابقه پنومونی از ۴ روز قبل تحت درمان با آزیترومایسین + سفتریاکسون با ضعف پیشرونده چهار اندام از ۲ روز پیش مراجعه نموده است. ضعف از اندام تحتانی شروع شده و به سمت اندام‌های فوقانی پیشرفت کرده است. هم‌اکنون به هیچ وجه قادر به راه رفتن نیست. احساس تنگی نفس دارد اما اختلال اسفنکتری ندارد. اندام‌ها شل و بدون رفلکس است.

کدام یک از اقدامات زیر در اولویت است؟

(محدودیت انتخاب: 5 گزینه – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
CBC, ESR, CRP				اثری ندارد
Nerve Conduction Study / Electromyography	*			مثبت
EEG		*		منفی
Brain CT	*			مثبت
Lumbar Puncture	*			مثبت
Sural Biopsy		*		منفی
HIV Test	*			مثبت
Lumbosacral MRI		*		منفی
Anti NMO antibody		*		منفی
Acetyl choline Receptor Antibody		*		منفی
Pulmonary Function Test	*			مثبت

۳ روز بعد از بروز علائم بنابر یافته‌های آلترودی‌اگنوستیک تشخیص Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy داده می‌شود. ضعف در حال پیشرفت است. کدام یک از اقدامات زیر توصیه می‌شود؟

(محدودیت انتخاب: 5 گزینه – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
ICU admission	*			مثبت
Considering time of presentation, no treatment is needed.		*		منفی
DVT prophylaxis	*			مثبت
Daily patient reassurance of good outlook of recovery	*			مثبت
IVIg or Plasma Exchange	*			مثبت
IVIg and Plasma Exchange		*		منفی
Discontinue Azithromycin		*		منفی
Discontinue Ceftriaxone		*		منفی
IV Cyclophosphamide		*		منفی
Rituximab		*		منفی
Methylprednisolone		*		منفی
Chest physiotherapy	*			مثبت