

افت پلاکت

نمره سوال: 6

خانم ۴۲ ساله‌ای پس از جراحی کیسه صفرا، هیپارین پروفیلاکتیک دریافت کرده است. یک هفته بعد، شمارش پلاکت‌ها از ۱۷۰ هزار به ۴۰ هزار کاهش یافته است. شمارش لکوسیت و هموگلوبین و PT و PTT نرمال است.

گزینه‌های صحیح مرتبط با محتمل‌ترین تشخیص و اقدامات مناسب برای رویکرد تشخیصی و درمانی به این بیمار را انتخاب کنید.

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

(4 مورد را انتخاب کنید)

0.50	رویت لام خون محیطی
1.00	محاسبه امتیاز 4Ts
1.00	بررسی بیمار از نظر ترومبوز، به ویژه DVT
0.00	بررسی Bleeding time
0.00	نمونه‌برداری مغز استخوان
0.00	سونوگرافی طحال
1.00	چک آنتی‌بادی anti-heparin/PF4
0.00	بررسی سطح فیبرینوژن
0.00	بررسی سطح هاپتوگلوبین
1.00	قطع هیپارین
1.00-	تجویز پلاکت روزانه بصورت پروفیلاکتیک
1.00	شروع آرگاتروبان یا ریواروکسابان به عنوان ضد انعقاد جایگزین
1.00-	استفاده از انوکسپارین بجای هیپارین
0.50-	با توجه به پلاکت پایین احتمال خونریزی بیشتر از ترومبوز است

آزمون: 16_ بیماری‌های داخلی_KF_هماتولوژی مدت آزمون: 5

1.00

حتی در غیاب ترومبوز اثبات شده نیز باید ضد انعقاد را مدنظر قرار داد

0.50

شروع وارفارین به تنهایی در فاز حاد می‌تواند خطر ترومبوز و گانگرن وریدی را افزایش دهد