

ایستگاه بیهوشی اطفال و نوزادان

در اتاق زایمان مادری دیابتیک و تحت درمان با انسولین و مایع امینوتیک مکونیاال هستید که تحت GA نوزاد 33 هفته با وزن 1.7 کیلوگرم به دنیا می‌آید و از شما به دلیل دسترس تنفسی نوزاد، درخواست می‌شود بر بالین نوزاد حاضر شوید. هنگامی که بر بالین نوزاد حاضر می‌شوید، نوزاد دارای سیانوز اندام‌ها و ضربان قلب 85 و تنفس نامنظم است.

اقدامات مناسب در این مرحله کدام است؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)


آزمون: 10_بیهوشی_PMP	مدت آزمون: 10
----------------------	---------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
قرار دادن سر نوزاد در پوزیشن هایپراکستنشن	می‌تواند باعث انسداد راه هوایی شود	-2.00	0.00	
ساکشن عمیق و مکرر راه هوایی و معده	دارای ریسک تحریک واگ و برادی‌کاردی هست	-1.00	0.00	
خشک کردن و گرم کردن و تحریک نوزاد	بهبود تنفس بیمار	3.00	0.00	
برقراری هیپوترمی کنترل‌شده برای بهبود انسفالوپاتی	در این شرایط بالینی ریسک انسفالوپاتی وجود ندارد	-1.00	0.00	
برقراری تهویه فشار مثبت (PPV) با $FI_{O2}=21\%$	با توجه به سن زیر ۳۵ هفته باید FI_{O2} بالاتر باشد	-2.00	0.00	
قرار دادن پالس اکسی متر در دست راست نوزاد	مناسب برای سنجش اکسیژناسیون پره داکتال	2.00	0.00	
در صورتی که بعد از ۵ دقیقه سطح سچوریشن اکسیژن به ۸۵٪ برسد پروگنوز تنفسی مناسب است	بعد از ۵ دقیقه ۸۵٪ مناسب است	1.00	0.00	
کاهش زمان دم به زیر یک ثانیه	بهبود شرایط تنفسی	1.00	0.00	
مانور رکروتمان (Recruitment) جهت بهبود اکسیژناسیون	باعث بدتر شدن شرایط می‌شود	-1.00	0.00	

بعد از اقدامات لازم سیانوز برطرف می‌شود و نوزاد دارای ضربان قلب ۱۳۸ است، ولی در معاینه تاکی‌پنه و دارای grunting و nasal flaring هست و سمع ریه به صورت دو طرفه و قرینه می‌باشد. کدامیک از اقدامات زیر در رابطه با بیمار صحیح می‌باشد؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
-------	---------	-------------	------------	-----

	0.00	2.00	بهبود تلاش تنفسی	برقراری nasal CPAP
	0.00	2.00-	حفظ هماتوکریت نوزاد در حد ۳۰ درصد	حفظ هماتوکریت نوزاد در حد ۳۰ درصد
	0.00	2.00	کاهش peak pressure	تجویز هرچه سریعتر سورفاکتانت
	0.00	1.00	اقدام مناسبی بود. انفیتراسیون قرینه دو طرفه و منتشر دیده می‌شود 	تهیه CXR
	0.00	2.00-	افزایش ریسک رتینوپاتی	افزایش FIO2 جهت افزایش سچوریشن در حد ۹۷ %
	0.00	2.00-	از آلبومین ۵ درصد استفاده شود	توصیه به استفاده از مایعات کریستالوئید ایزوتون و عدم استفاده از کلئیدها
	0.00	1.00	بهبود تنفس	تجویز کافئین برای کاهش Apnea of prematurity

بعد از انتقال نوزاد به NICU، بعد از حدود ۸ ساعت نوزاد دچار افت همودینامیک و فشارخون و آپنه‌های طولانی می‌شود و در آزمایش‌های ارسال شده، موارد زیر رؤیت شد. کدام اقدامات مناسب است؟

Hb: 16 , HCT: 49% , Na: 134 , K: 4.3 , Ca: 6.5 , Bs: 50

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	1.00	بهبود شرایط بالینی	تجویز 2ml/Kg دکستروز 10%
	0.00	1.00-	کاهش قند با سابقه مصرف انسولین مادر قابل پیش‌بینی هست	ارسال آزمایش جهت بررسی سطح انسولین نوزاد
	0.00	2.00-	برادی کاردی شدید می‌دهد	تجویز سریع و بولوس ۴ سی‌سی کلسیم گلوکونات ۱۰ %

	0.00	1.00-	هیپوکلسمی با سابقه مصرف انسولین مادر قابل پیش‌بینی هست	ارسال آزمایشات هورمونی تیروئیدی و پاراتیروئیدی
	0.00	1.00	این اقدام لازم است	مانیتورینگ ECG حین تجویز کلسیم
	0.00	0.00	شواهد مسمومیت با مخدر وجود ندارد	تجویز نالوکسان
	0.00	2.00-	نوزاد آنمیک نیست	تزریق 10 cc/kg پک سل