

کاردیومیوپاتی اتساعی

بیمار آقای ۳۰ ساله که به دلیل تنگی نفس فعالیتی به اورژانس مراجعه می‌نماید، در شرح حال سابقه مصرف مزمن الکل را می‌دهد، در ارزیابی به عمل آمده: هیپرتانسیون منفی، سونوگرافی شکم و لگن: احتقان کبد مثبت، هولتر مانیتورینگ: نرمال، اکوکاردیوگرافی: ضایعات دریچه‌ای قلب منفی، برون‌ده قلبی کاهش یافته، در خصوص ضخامت دیواره بطن و دهلیز اظهار نظر نشده است و آنژیوگرافی عروق کرونر نرمال می‌باشد.

در خصوص تشخیص احتمالی کیس مطرح شده، کدام گزینه‌ها صحیح می‌باشد؟

(محدودیت در انتخاب: 4 گزینه)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
بررسی Viral genome می‌تواند کمک‌کننده باشد.	*			مثبت
در اکو انجام شده احتمال هیپرتروفی غیرقرینه دیواره بین بطنی شایع می‌باشد.				اثری ندارد
در ۳۰ - ۴۰ درصد موارد می‌تواند منشأ فامیلیال داشته باشد.	*			مثبت
در اکو انجام شده احتمال اتساع حفرات بطنی بالا می‌باشد.	*			مثبت
با توجه به بررسی بافت‌شناسی Significant تشخیص آن پاتولوژیک می‌باشد.				اثری ندارد
در اکثر موارد به صورت اتوزومال غالب به ارث می‌رسد.				اثری ندارد
معمولا شایع‌ترین علت Congestive heart failure می‌باشد.	*			مثبت

بر اساس کیس مطرح شده در بالا، کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص پاتولوژی آن می‌تواند صحیح باشد؟

(محدودیت در انتخاب: 2 گزینه)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
هموکروماتوزیس				اثری ندارد
علل وایرال	*			مثبت
علل اتوایمیون	*			مثبت
آمیلوئیدوزیس				اثری ندارد