

خانم ۳۶ ساله‌ای با وزن ۵۰ کیلوگرم و سابقه میگرن و دردهای اسکلتی عضلانی مزمن، سابقه مصرف گهگاهی الکل با شکایت تهوع، درد اپیگاستر، سرگیجه، وزوز گوش و کاهش ادرار ۲۴ ساعته اخیر به اورژانس مراجعه می‌نماید. بیمار طی روز اخیر ایبوپروفن (۵۵ قرص ۴۰۰ میلی‌گرمی) و داروهای مسکن ترکیبی OTC زیادی دریافت کرده است. در ۱۲ ساعت اخیر کاهش ادرار و گیجی خفیف، دو بینی و تشنج پیدا کرده است. بیمار تب، اسهال و استفراغ خونی، آنژیوادم، و ادم صورت، کهیر و علائم کبدی ندارد.

کدام یافته شرح حال بیشترین ارزش را در افتراق مسمومیت با NSAIDs از سایر تشخیص‌های افتراقی دارد؟

(محدودیت در انتخاب: 5 گزینه)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
دوز ایبوپروفن	*			مثبت
درد اپیگاستر بدون اسهال	*			مثبت
کاهش اخیر حجم ادرار	*			مثبت
مصرف بالای استامینوفن				اثری ندارد
تعریق و هیپرترمی				اثری ندارد
مصرف همزمان داروهای OTC ترکیبی	*			مثبت
سابقه مصرف الکل				اثری ندارد
اختلال هوشیاری خفیف	*			مثبت
عدم وجود علائم کبدی				اثری ندارد
عدم وجود علائم پوستی				اثری ندارد
عدم وجود ادم صورت				اثری ندارد

در ارزیابی‌های تکمیلی در معاینات و آزمایش‌ها هیپوتاسیون، هیپوترمی، هیپرکالمی، اسیدوز متابولیک خفیف، هیپرکلسمی، عدم افزایش آنیون گپ و لاکتات، آکالوز تنفسی، افزایش نوتروفیل و پروتئین در مایع CSF، هیپوگلیسمی، افزایش bleeding time مشاهده شد.

کدام یافته‌ها بیشترین ارزش تشخیصی NSAIDS را دارد؟

(محدودیت در انتخاب: 5 گزینه)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
افزایش کراتینین	*			مثبت
هیپرکالمی	*			مثبت
آکالوز تنفسی				اثری ندارد
هیپوگلیسمی				اثری ندارد
هیپوتاسیون	*			مثبت
افزایش نوتروفیل CSF	*			مثبت
اسیدوز متابولیک	*			مثبت
عدم افزایش آنیون گپ				اثری ندارد
هیپرکلسمی				اثری ندارد

در صورت تایید تشخیص بر اساس یافته‌های قبلی، کدامیک از درمان‌های ذیل را انتخاب می‌کنید؟

(محدودیت در انتخاب: 5 گزینه)

وضعیت نمره	خطای فاحش	گزینه نادرست	گزینه صحیح	گزینه
مثبت			*	قطع کامل NSAIDs
مثبت			*	شارکول گاواژ شود
مثبت			*	نوار قلب
مثبت			*	اصلاح آب و الکترولیت
اثری ندارد				دیالیز برای دفع دارو
اثری ندارد				قلیایی کردن ادرار
اثری ندارد				WBI شستشوی کامل روده
اثری ندارد				قلیایی کردن خون
مثبت			*	اصلاح اسیدوز صرفاً در موارد شدید