

عنوان و یا نام سناریو

نمره سوال: 10

خانمی ۴۸ ساله برای ارزیابی پیش از شروع درمان با تیرزپاتاید تحت سونوگرافی تیروئید قرار گرفته است. در سونوگرافی، یک ندول تیروئید به قطر ۱ سانتی‌متر به‌طور اتفاقی مشاهده شده است. بیمار دیسفاژی و تنگی نفس ندارد و در معاینه لنفادنوپاتی گردنی لمس نمی‌شود.

با توجه به اطلاعات بالینی، کدامیک از اقدامات زیر در مدیریت این بیمار مناسب است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

(5 مورد را انتخاب کنید)

3.00	درخواست اندازه‌گیری TSH سرم
2.00	بررسی دقیق ویژگی‌های ندول و تعیین ریسک سونوگرافیک بر اساس سیستم TI-RADS
3.00-	ارجاع بیمار برای FNA ندول تحت هدایت سونوگرافی
2.00	بررسی سابقه خانوادگی سرطان تیروئید
2.00-	انجام اسکن و سیتی‌گرافی تیروئید
1.00-	درخواست کلسی‌تونین سرم
2.00-	درخواست CT اسکن گردن
1.00-	درخواست اندازه‌گیری آنتی‌بادی ضد پراکسیداز تیروئید (Anti TPO)
0.00	توصیه به اصلاح رژیم غذایی و مصرف غذاهای دریایی
0.00	بررسی علائم فشاری و تغییر صدا
1.00-	درخواست اندازه‌گیری Free T4 سرم
2.00	بررسی علایم پرکاری و کم‌کاری تیروئید
0.00	آموزش به بیمار در مورد علایم هشدار بزرگ شدن ندول
0.00	بررسی سابقه خانوادگی بیماری‌های خوش‌خیم تیروئید
0.00	درخواست اندازه‌گیری آنتی‌بادی ضد تیروگلوبولین (Anti-Tg)
1.00	توصیه به مراجعه دوره‌ای برای ارزیابی تیروئید