

استنوز هایپرتروفیک پیلور

شیرخوار ۴۰ روزه با استفراغ های غیر صفراوی و جهنده ای که از چند روز پیش شروع شده به درمانگاه آورده شده است والدین می گویند پس از چند دقیقه شیر خوردن استفراغ های جهنده دارد و پس از هر بار استفراغ مجددا شیر زیادی می خورد. در طی این چند روز کاهش وزن داشته و دفعات ادرار و مدفوع نیز کم شده است. در معاینه بیمار مختصری بی حال است و مخاط ها خشک بوده و در معاینه شکم در ناحیه RUQ زیر لبه کبد توده سفت و موبایل لمس می شود.

اقدامات مناسب کدام است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 04_جراحی عمومی_PMP	مدت آزمون: 5
---------------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
ازمایش خون و بیوشیمی	انجام شد	2.00	0.00	
ABG		2.00	0.00	
گذاشتن لوله بینی معده ای	انجام شد	1.00	0.00	
عکس توراکس	انجام شد	1.00	0.00	
باریوم سوالو	اندیکاسیون ندارد	3.00-	0.00	
سونوگرافی شکم	طول کانال پیلور 1۷ mm و ضخامت ۵ mm	2.00	0.00	

آزمایشات ارسال شد:

HB= 9.5 , WBC= 10000

Na= 138 , K= 2.8 , Cl= 82 , BUN= 30 , Crt.=1.1

PH= 7.55

PaCO2= 47

HCO3= 42

شیرخوار جهت عمل جراحی کاندید می شود. برای آمادگی عمل کدام مورد را انتخاب می کنید؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
انتقال به اتاق عمل به صورت فوری	اشتباه است	4.00-	0.00	

	0.00	3.00-	پایداری علایم حیاتی شرط کافی نیست	پس از پایداری علایم حیاتی پس از ۶ ساعت به اتاق عمل منتقل می‌شود
	0.00	5.00	انتخاب درستی است	پس از اصلاح اختلالات آب و الکترولیتی بیش از ۲۴ ساعت بعد به اتاق عمل منتقل می‌شود

بیمار پس از اصلاح اختلالات آب و الکترولیتی و اسید و باز به اتاق عمل منتقل شد.

گزینه انتخابی برای رویکرد جراحی کدام است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
پیلوروپلاستی	اشتباه است	2.00-	0.00	
گاسترودئودنوستومی	اشتباه است	2.00-	0.00	
پیلورومیوتومی رامستد	صحیح است	4.00	0.00	