

طحال

بیمار خانم جوانی است که به دنبال تصادف با اتومبیل به بیمارستان آورده شده است. بیمار به راحتی صحبت می‌کند، اما از وجود مقداری خون در دهان شاکی است. گردن بیمار با کولار بی‌حرکت می‌شود؛ بیمار کمی مضطرب است. دیسترس تنفسی ندارد، اما کاهش صدا در سمت راست دارد. رگ‌های گردن برجسته نیست. علایم حیاتی به شکل زیر است:

BP= 85/60 , PR= 138 , RR= 25

اقدامات شما کدام است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 13_ جراحی عمومی_PMP	مدت آزمون: 5
----------------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
دریافت اکسیژن با ماسک	مناسب است	2.00	0.00	
اینٲتوباسیون اوروتراکیال با توجه به خون در حفره دهان	اندیکاسیون ندارد	-5.00	0.00	
استفاده از ماسک حنجره جهت جلوگیری از آسپیره کردن خون	اندیکاسیون ندارد	-3.00	0.00	
نیدل توراکوستومی	اندیکاسیون ندارد	-2.00	0.00	
Finger thoracostomy	اندیکاسیون ندارد	-3.00	0.00	
تعبیه فوری لوله سینه	اندیکاسیون ندارد	-2.00	0.00	
محاسبه سطح هوشیاری و معاینه عصبی بیمار	۱۵/۱۵ علایم لاترالیزه عصبی ندارد	3.00	0.00	
معاینه سیستمیک بیمار	انجام شد	3.00	0.00	
گرفتن رگ قطور شروع مایع درمانی تهاجمی به همراه خون با کمک هیتر	انجام شد	5.00	0.00	
برای بیمار به سرعت پروتکل MTP اجرا می‌گردد	انجام شد	5.00	0.00	
FAST	انجام شد	4.00	0.00	

در معاینه بیمار Raccoon eye سمت چپ و تندنس همی توراکس راست و بالای شکم به همراه تندرنس شدید لگنی دارد.

پس از احیای اولیه علایم حیاتی اندکی بهتر می‌شود و پایدار است.


در FAST مایع در فضای اسپلنورنال داریم.

اقدامات بعدی کدام است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
لوله بینی معده‌ای	ممنوع است	5.00-	0.00	
سوند فولی	انجام شد ادرار غلیظ دارد	2.00	0.00	
سی تی مغز	شکستگی مشکوک قاعده مغز دارد	2.00	0.00	
سی تی توراکس و شکم و لگن	انجام شد	5.00	0.00	
گرافی هیپ و فمور	نیازی نیست	0.00	0.00	
تجویز آنتی‌بیوتیک	انجام شد	1.00	0.00	
تجویز مسکن	داده شد	1.00	0.00	
بستن کمر بند لگنی	انجام شد	3.00	0.00	

در کات‌های سی تی یافته‌های زیر دیده می‌شود:



بیمار پس از دو ساعت مجدداً ناپایدار می‌شود، اما مشکل راه هوایی و دیسترس تنفسی ندارد. اقدام شما کدام است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
انتقال به اتاق عمل و اسسپلنکتومی	مناسب است	4.00	0.00	
پک لگن و تحت نظر گرفتن بیمار	انتخاب مناسبی نیست	3.00-	0.00	
پک لگن و آماده کردن بیمار برای انژیوآمبولیزاسیون	انتخاب مناسبی نیست	1.00-	0.00	

	0.00	4.00-	انتخاب مناسبی نیست	ادامه احیا و در صورت پاسخ ادامه رویکرد محافظه کارانه
--	------	-------	--------------------	--