

توده ریه

در بیماری که به علت علائم تنفسی تحت بررسی قرار گرفته است، در سی تی اسکن قفسه سینه توده حدود ۳ سانتی متری در هیلوم ریه راست همراه با لنفادنوپاتی ساب کارینال دیده می شود. در برونکوسکوپی، اثر فشاری بر مجاری هوایی بدون شواهد توده اندوبرونکیال مشاهده می شود.

مناسب ترین اقدام تشخیصی بعدی کدام است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 16_ جراحی عمومی_ PMP	مدت آزمون: 5
-----------------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
واشینگ حین برونکوسکوپی	کاربردی ندارد	0.00	0.00	
براشینگ حین برونکوسکوپی	انتخاب مناسبی نیست	-2.00	0.00	
بیوپسی پرکوتانه تحت گاید سی تی	انتخاب مناسبی نیست	-2.00	0.00	
بیوپسی ترانس برونشیل EBUS	روش درست را انتخاب کردید	5.00	0.00	
توراکوسکوپی و بیوپسی	انتخاب مناسبی نیست	-2.00	0.00	

در بیوپسی اندو برونکیال EBUS تومور ریه از نوع non small cell carcinoma با درگیری غده لنفاوی ساب کارینا (N2) تأیید شد. در بررسی های تکمیلی شواهدی از متاستاز دوردست ندارد.

مناسب ترین اقدام درمانی کدام است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
لوبکتومی یا پنومونکتومی	انتخاب مناسبی نیست	-4.00	0.00	
شیمی درمانی	انتخاب مناسبی نیست	-2.00	0.00	
رادیوتراپی به تنهایی	انتخاب مناسبی نیست	-2.00	0.00	
کمو رادیوتراپی ± ایمونوتراپی تثبیتی	بهترین رویکرد درمانی است	4.00	0.00	
مراقبت حمایتی صرف	انتخاب مناسبی نیست	-4.00	0.00	
رادیوتراپی و سپس ارزیابی مجدد	انتخاب مناسبی است	3.00	0.00	