

زخم بستر

مرد ۶۵ ساله با پاراپلژی ناشی از آسیب نخاعی، به علت زخم فشاری مزمن ساکرال از ۳ ماه قبل بستری شده است. بخش عمده بستر زخم با اسکار قهوه‌ای (Eschar) پوشیده شده است که بنا بر گفته همراه بیمار قبلاً دارای تاول خونی نیز بوده است. بیمار تب‌دار است و آزمایش‌ها به شرح زیر می‌باشد:

آلبومین سرم: 2.5g/dL

Hb: 9 g/dL

WBC: 16,000/mm³

پروکلسی تونین= 5.5 ng/ml



زخم در چه مرحله‌ای است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

مدت آزمون: 5	آزمون: 21_ جراحی عمومی_ PMP
--------------	-----------------------------

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	3.00-	این طبقه بندی درست نیست؛ ادامه مدیریت بر پایه آن نامناسب خواهد بود	Stage II
	0.00	1.00-	عمق واقعی تا دبریدمان انجام نشود مشخص نمی‌شود.	Stage IV
	0.00	5.00	صحیح است؛ چون بستر زخم با اسکار و اسلاف پوشیده است، تا دبریدمان کامل نمیتوان مرحله را تعیین کرد.	Unstageable Pressure

بیمار تب‌دار و با شواهد سپسیس (لکوسیتوز و پروکلستونین بالا) و از نظر تغذیه‌ای، دچار کاهش آلبومین و کم‌خونی است.

اولویت‌های درمانی را انتخاب کنید.

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
تزریق آلبومین وریدی	این اقدام انجام شد	0.00	0.00	
اصلاح کالری (۳۰ تا ۳۵ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن در روز)	این اقدام انجام شد	1.00	0.00	
ترانسفوزیون خون	اندیکاسیون ندارد	2.00-	0.00	
تجویز پروتئین (۲-۱/۵ گرم/کیلوگرم/روز)	انجام شد	1.00	0.00	
ادامه درمان کانزواتیو	رویکرد مناسبی نیست	4.00-	0.00	
کاهش فشار بر ناحیه ساکرال با تغییر وضعیت بیمار	این اقدام انجام شد	2.00	0.00	
کشت خون و شروع آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف	این اقدام انجام شد	2.00	0.00	

بستر زخم همچنان با بافت نکروزه و اسکار پوشیده است و بیمار شواهد عفونت سیستمیک دارد. بهترین گزینه‌ها را در مدیریت زخم این بیمار در این مرحله انتخاب کنید.

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
Wet to Dry dressing	به تنهایی روش موثری نیست	3.00-	0.00	
maggot therapy لارو درمانی	اقدام مناسبی نیست	3.00-	0.00	
serial debridement	این اقدام انجام شد؛ بافت نکروزه برداشته و دبریدمان انجام شد	5.00	0.00	
Negative-pressure wound vacuum	روش مناسبی برای این مرحله نیست	3.00-	0.00	
گرفتن کشت عمقی بافت حین دبریدمان	انجام شد	3.00	0.00	
دبریدمان آنزیماتیک (کلاژناز)	روش مناسبی نیست	2.00-	0.00	

در دبریدمان انجام‌شده، مقادیر زیادی بافت نکروزه و چرک وجود دارد و نکروز تا سطح استخوان ساکروم ادامه دارد. کدام گزینه‌های زیر را در تشخیص و درمان این بیمار انتخاب می‌کنید؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
-------	---------	-------------	------------	-----

	0.00	3.00-	انتخاب مناسبی نیست	بستن اولیه زخم بدون فلپ
	0.00	2.00	انجام شد و استئومیلیت گزارش شد	Bone biopsy جهت رد استئومیلیت
	0.00	3.00-	حداقل ۶ هفته لازم است	تجویز دو هفته آنتی بیوتیک
	0.00	2.00	انجام شد.	Ostectomy در حین جراحی
	0.00	2.00	نقص ساکراال با فلپ گلوتهال و بافت سالم پوشانده شد	پوشش زخم با فلپ