


سودوسیست

مرد ۲۳ ساله که ۵ ماه قبل از پذیرش دچار ترومای نافذ به ناحیه پانکراس شده است و بدون جراحی درمان شده با درد شکم و تهوع مراجعه می‌کند.

تصویر سی‌تی‌اسکن را می‌بینید:



در این مرحله، بهترین تصمیم کدام است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

مدت آزمون: 5				آزمون: 24_ جراحی عمومی_ PMP
--------------	--	--	--	-----------------------------

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	4.00-	تصمیم مناسبی نیست	درناژ پرکوتانه
	0.00	2.00-	تصمیم مناسبی نیست	conservative management and follow up
	0.00	4.00	امکان‌پذیر نیست	Endoscopic drainage

	0.00	2.00	تصمیم مناسبی است	عمل جراحی جهت درناژ داخلی
--	------	------	------------------	---------------------------

با توجه به تصمیم همکار گوارش جهت ارجاع مجدد بیمار به شما با این توضیح که امکان تعبیه درناژ نیست؛ مناسب‌ترین اقدام در این مرحله کدام است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
Cystoentrostomy	درست است	5.00	0.00	
distal pancreatectomy	مناسب نیست	5.00-	0.00	
برداشتن کیست	مناسب نیست	4.00-	0.00	