


گلوکوم

نمره سوال: 10

آقای ۳۷ ساله با علایم سنگینی خفیف چشم راست به همراه احساس هاله در اطراف نور و تاری مختصر دید از ۶ ساعت قبل مراجعه کرده است. سابقه علایم مشابه را در دو نوبت طی ۱۵ سال گذشته ذکر می‌کند که دربار اول چشم راست لیزر هم شده است. در حملات قبلی علایم با درمان در عرض چند روز بهبود پیدا می‌کرده و در فاصله حملات مشکلی نداشته است. در معاینه نکات زیر دید می‌شود:

دید چشم راست و چپ به ترتیب ۲۰/۳۰ و ۲۰/۲۰ و فشار چشم راست ۴۵ و چپ ۱۶ میلی‌متر جیوه می‌باشد. زاویه هر دو چشم درگونوسکپی C30r بوده و اتاق قدامی نکته قابل توجهی نداشته و وضعیت قرنیه و ملتحمه مطابق تصویر است. در معاینه فوندوس کاپ راست و چپ ۰.۳ می‌باشد.

با توجه به نتایج معاینات و تصویربرداری‌های تشخیصی بیمار که در زیر آورده شده است کدامیک از اقدامهای زیر در خصوص این بیمار صحیح است؟



(5 مورد را انتخاب کنید)

0.00	Argon laser Iridoplasty
2.00	OCT اطراف دیسک برای پیگیری بعدی
0.00	قرص آسیکلوویر ۸۰۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت
0.00	انجام میدان دید در فاز حاد
2.50	قطره بتامتازون هر ۸ ساعت
0.00	قطره پیلوکارپین ۲٪ دو نوبت به فاصله ۵ دقیقه
0.00	توصیه به انجام SLT
1.00	AC Tap برای رد عفونت CMV
0.00	انجام تست های روماتولوژیک

0.00	شروع قطره زالاتان
0.00	شروع قطره دورزولامید/تیمولول برای پیشگیری از حملات بعدی
2.50	به بیمار اطمینان می دهیم که احتمال درگیری چشم مقابل نادر است.
2.00	تجویز قرص استازولامید ۵۰۰ میلیگرم