



نمره سوال:10

مرد ۶۰ ساله‌ای جهت بررسی و درمان گلوکوم ارجاع شده است. سابقه جراحی و تروما به چشم وجود ندارد. در معاینه فشار داخل چشم ۳۶ میلی‌متر جیوه می‌باشد. چشم مقابل نیز نمای مشابه دارد و دارای فشار داخل چشم ۳۰ میلی‌متر جیوه می‌باشد.





با توجه به اسلیت فوتو، گزینه های صحیح را انتخاب نمایید.

(5 مورد را انتخاب کنید)

2.00	عمل جراحی کاتاراکت برای کنترل گلوکوم کمک کننده است.
2.50	در گونیوسکوپی معمولا زاویه اتاق قدامی تنگ یا بسته می باشد.
0.00	گرفتن نمونه از مایع زلالیه و انجام آنالیز آزمایشگاهی جهت تایید تشخیص کمک کننده است.
0.00	معمولا سابقه حملات قبلی التهاب داخل چشمی وجود دارد.
2.50	احتمال ایجاد عارضه حین عمل جراحی کاتاراکت بیشتر از بیماران دیگر است.
2.00	توصیه به استفاده از آیریس رترکتور حین عمل جراحی کاتاراکت می شود.
1.00	استفاده از ژل های با ویسکوزیته بالاتر به کاهش عوارض حین عمل کمک می کند.
0.00	احتمال فعال شدن بیماری بعد از عمل جراحی کاتاراکت وجود دارد.
0.00	توصیه به شروع درمان پروفیلاکتیک سیستمیک چند روز قبل از عمل می شود.
0.00	شروع درمان پروفیلاکتیک سیستمیک بلافاصله بعد از عمل به کاهش التهاب بعد از عمل کمک می کند.
0.00	احتمال ایجاد انفیلتراسیون استرومال قرنیه بالا می باشد.
0.00	ممکن است در طول سیر بیماری، رسوبات التهابی بر روی اندوتلیوم قرنیه ایجاد شود.