




.

بیمار ۳۴ ساله ای با کاهش دید دو چشم مراجعه نموده است. در معاینه دید چشم راست 1/10 و چشم چپ ۲ متر شمارش انگشتان است. در معاینه اسلیت لامپ ویتريت خفیف دو چشم دارد. چشم راست هم نمای مشابه دارد. فشار داخل چشم راست ۱۴ و چشم چپ ۳۰ میلی‌متر جیوه است.





کدامیک از یافته‌های زیر در تصاویر دیده می‌شود؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
Retinitis in fundus photography				اثری ندارد
Cotton wool in fundus photography				اثری ندارد
Choroidal thickening	*			مثبت
Shallow irregular PED				اثری ندارد
Hard exudate				اثری ندارد
Drusen				اثری ندارد
Fibrinous septa	*			مثبت
Hyperreflective focus	*			مثبت
Intraretinal cyst				اثری ندارد
Capillary nonperfusion				اثری ندارد
Vasculitis				اثری ندارد
Macular ischemia				اثری ندارد
Telangiectasia				اثری ندارد

کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
برای تشخیص سونوگرافی چشم ضروری است				اثری ندارد
PCR ویتره در تشخیص کمک کننده است				اثری ندارد
ICG برای مانیتورینگ درمان مفید است	*			مثبت
درمان آنتی توکسوپلاسموزیس کلاسیک ضروری است				اثری ندارد
تزریق داروی آنتی وپروس داخل ویتره و خوراکی لازم است				اثری ندارد
استروئید با دوز بالا در شروع درمان ضروری است	*			مثبت
تجویز ایمونو مودولاتورها ریسک التهاب مزمن را کاهش می دهد	*			مثبت
داروهای آلکله کننده در شروع درمان لازم است				اثری ندارد
حداکثر سه ماه درمان لازم است				اثری ندارد
تزریق آمفوتریسین B داخل ویتره و ضد قارچ خوراکی لازم است				اثری ندارد
ویتراکتومی عمیق و داروی ضد قارچ خوراکی اندیکاسیون دارد				اثری ندارد
تزریق استروئید داخل ویتره کنترااندیکه است				اثری ندارد