





بیمار خانم ۴۲ ساله با شکایت از تاری دید مرکزی هر دو چشم از چند سال قبل، جهت انجام لیزر PDT دو چشم به شما ارجاع شده است.





با توجه به تصاویر، کدام گزینه‌ها درست است؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
لیزر PDT را با نصف دوز verteporfin انجام می‌دهیم.				اثری ندارد
معاینه بستگان درجه یک (پدر و مادر) بیمار کمک‌کننده است.	*			مثبت
تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب همراه با PDT درمان ارجح است.				اثری ندارد
برای بیمار داروی اپلرنون خوراکی تجویز می‌کنیم و یک تا دو ماه بعد مجدداً بیمار را بررسی می‌کنیم				اثری ندارد
مشاوره روانپزشکی و تجویز داروهای ضد استرس کمک‌کننده است.				اثری ندارد
بیمار را بدون اقدام درمانی فالوآپ می‌کنیم.	*			مثبت
بررسی ژنتیکی بیمار می‌تواند در تشخیص بیماری کمک‌کننده باشد.	*			مثبت
مصرف داروهای استروئیدی باعث تشدید بیماری می‌شود.				اثری ندارد
تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب در حال حاضر کمکی به بیمار نمی‌کند.	*			مثبت
در صورت عدم دسترسی به verteporfin، لیزر فوتوکواگولاسیون ماکولا (MPC) می‌تواند در کاهش مایع زیر شبکیه موثر باشد.				اثری ندارد