



پنوموتوراکس

آقای ۶۵ ساله با سابقه دیابت، فشار خون، دیس لیپیدمی و COPD با درد پلورتیک قفسه سینه و دیس پنه توسط EMS به اورژانس آورده شد.

در معاینه بالینی همکاری لازم جهت سمع ریه ها را ندارد. ادم گوده گذار هر دو اندام تحتانی دارد و هوشیار است.

BP= 90/60 mmHg, PR= 125/min, BT= 37 °C, SpO₂= 90% (with face mask), RR= 28/min

نوار قلب بیمار را ملاحظه می‌نمایید.



اقدامات صحیح را انتخاب کنید.



(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
تکرار نوار قلب ۲۰ دقیقه بعد	*			مثبت
RUSH Examination	*			مثبت
چک CPK, CPKMB				اثری ندارد
چک کردن High Sensitive Troponin	*			مثبت
چک کردن D-dimer	*			مثبت
Chest CT با کنتراست شریان پولمونی		*		منفی
Chest CT با کنتراست شریان آئورت		*		منفی
آسپرین خوراکی				اثری ندارد
مورفین وریدی		*		منفی
نیترات زیر زبانی		*		منفی
اسمولول ورید		*		منفی
انفوزیون tPa		*		منفی
انتوباسیون به روش RSI		*		منفی

در بررسی اولیه قطر آئورت صعودی ۳ سانتی متر می باشد دیس کنزی بطن چپ ندارد. D-dimer بیمار منفی و تروپونین اولیه بیمار منفی است،
نوار قلب بیمار تغییرات دینامیک ندارد

نمای اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی قفسه سینه بیمار در زیر دیده می شود:





مناسبترین اقدامات در این مرحله کدامند؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
تعبیه کاتتر Pigtail در فضای پلور راست		*		منفی
تعبیه Chest tube در فضای پلور چپ	*			مثبت
CT اسکن قفسه سینه		*		منفی
پریکاردیوسنتز اورژانسی		*		منفی
CT آنژیوگرافی شریان آئورت		*		منفی
ترمبولیز مستقیم از طریق کاتتر پولمونی		*		منفی
ترومبکتومی باز شریان پولمونی		*		منفی