

طب کار

یک کارگر مرد ۴۵ ساله در ۱۰ سال اخیر روزانه ۸ تا ۱۰ ساعت مشغول به انجام جوشکاری **Shielded metal arc** روی استیل ضدزنگ بوده است.

در مورد این شغل و عوامل زیان آور آن، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 04_طب کار_PMP	مدت آزمون: 6
----------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
فیوم تولید شده حاوی ترکیبات مگنیز است.		2.00	0.00	
هنگام استنشاق فیوم تماس تنفسی با کروم سه ظرفیتی رخ می دهد.		2.00-	0.00	
مواجهه با کادمیوم هنگام کار رخ می دهد.		2.00-	0.00	
مواجهه با فلوراید وجود دارد.		2.00	0.00	
اشعه ماوراء بنفش با طول موج ۲۹۰ تا ۳۰۰ نانومتر جزء مخاطرات این شغل است.		2.00	0.00	
اغلب مواجهه با صدای ۹۰ دسی بل هنگام کار رخ می دهد.		2.00-	0.00	

به دنبال تماس های شغلی این فرد، کدام عوارض و یافته های بالینی ناشی از مواجهات شغلی در این فرد محتمل است؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
رسوب پارتنیکل های فیبروزیک اکسید آهن در ریه ها		2.00-	0.00	
فتوکراتیت به دنبال مواجهات شغلی		1.00	0.00	
آسم ناشی از تماس		2.00	0.00	
آسیب سطح قدامی عدسی همراه با درد و سوزش چشم		2.00-	0.00	
تحریکات غیر اختصاصی دستگاه تنفس فوقانی ناشی از تماس ترکیبات نیکل		1.00	0.00	
احتمال افزایش کانسر ریه ناشی از مواجهات		1.00	0.00	

به دنبال بروز بیماری‌های ناشی از این شغل، یافته‌های مورد انتظار کدامند؟

(بدون محدودیت در انتخاب گزینه‌ها – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
در صورت بروز سیدروزیس در نمای رادیوگرافیک ریه ندول‌های پراکنده محدود دیده می‌شود.		2.00-	0.00	
در تماس مزمن با فیوم در این شغل افزایش ضخامت پلور دیده می‌شود.		2.00-	0.00	
در این بیماری کلسیفیکاسیون پلور رخ نمی‌دهد.		2.00	0.00	
شاخص‌های عملکردی ریه کاهش می‌یابد.		1.00	0.00	
افزایش ریسک بروز COPD وجود دارد.		1.00	0.00	