

طب کار

خانم ۳۴ ساله کارشناس فیزیوتراپی با سابقه ۱۲ سال اشتغال در بیمارستان، دو روز پس از انجام اقدامات توانبخشی برای یک بیمار، متوجه ابتلای بیمار به سل می‌شود. تست PPD ایشان در بدو استخدام منفی بوده است. در شرح حال، علائم بالینی مثبتی ندارند و در معاینه، سمع ریه نرمال می‌باشد.

توصیه شما کدام است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

آزمون: 06_طب کار_PMP	مدت آزمون: 6
----------------------	--------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
گرافی قفسه صدري		0.00	0.00	
سی‌تی‌اسکن ریه		0.00	0.00	
QuantiFERON (IGRA) Two step		0.00	0.00	
تست PPD		4.00	0.00	
شروع درمان پروفیلاکسی		1.00-	0.00	
بررسی از نظر بروز علائم		0.00	0.00	
بررسی اسمیر خلط		0.00	0.00	

نتیجه بررسی انجام شده منفی است. کدام مورد توصیه مناسب‌تری است؟

(انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
شروع درمان پروفیلاکسی		1.00-	0.00	
انجام گرافی قفسه صدري	اندیکاسیون ندارد	0.00	0.00	
انجام سی‌تی‌اسکن ریه		0.00	0.00	
انجام تست PPD ۱۰ هفته بعد	نتیجه PPD:16mm induration	4.00	0.00	
انجام تست PPD دو مرحله‌ای "۱ تا ۳ هفته بعد"		0.00	0.00	

	0.00	0.00	فالو آپ ایشان از نظر بروز علائم
--	------	------	---------------------------------

با توجه به معاینه بالینی نرمال و نتایج به دست آمده، کدام یک توصیه می گردد؟

(بدون نمره منفی)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	0.00		اسمیر و کشت خلط
	0.00	0.00		برونکوسکوپی
	0.00	3.00	نتیجه گرافی : نرمال	Chest x ray
	0.00	0.00		شروع درمان پروفیلاکسی
	0.00	0.00		شروع درمان ۴ دارویی
	0.00	0.00		صرفاً فالو آپ بیمار از نظر بروز علائم توصیه می شود.

با توجه به نتایج مشاهده شده، کدام توصیه جهت ایشان مناسب تر است؟

(بدون نمره منفی)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	0.00		دوری از مواجهه تا مشخص شدن نتیجه اسمیر و کشت خلط
	0.00	0.00		ادامه اشتغال و پایش از نظر بروز علائم بالینی
	0.00	4.00		ادامه اشتغال و شروع درمان پروفیلاکسی