

گوارش

این سوال سه قسمت دارد

شیرخوار ۳ ماهه‌ای به علت بالا آوردن شیر بدنبال تغذیه ارجاع شده است. این علائم از ۳ هفتگی شروع و بتدریج بیشتر شده است. در معاینه شیرخوار کاملاً نرمال است.

کلیدی ترین نکات، که در رسیدن به تشخیص، بیشترین کمک را می‌نمایند، کدام موارد هستند ؟

(محدودیت انتخاب: 6 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
ایکتر نوزادی				اثری ندارد
نوع شیر	*			مثبت
نوع زایمان				اثری ندارد
دفع مدفوع کودک	*			مثبت
محتویات بالا آورده	*			مثبت
سن مادر				اثری ندارد
سن پدر				اثری ندارد
سابقه فامیلی میگرن				اثری ندارد
وضعیت رشدی کودک	*			مثبت
محل زندگی کودک				اثری ندارد
عطسه				اثری ندارد
نحوه شیردهی	*			مثبت
جهنده بودن	*			مثبت

تغذیه با شیرمادر بوده، استفراغ غیرجهنده و حاوی بخشی از شیر خورده شده است و بعد از استفراغ شیرخوار خوش حال است. دفع مدفوع نرمال و رشد مناسبی دارد. کلیدی ترین موارد برای رسیدن به تشخیص را انتخاب نمایید؟

(محدودیت انتخاب: 2 گزینه – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
تست های انعقادی				اثری ندارد
ESR				اثری ندارد
آزمایش ساده مدفوع	*			مثبت
کشت مدفوع				اثری ندارد
تست های کبدی				اثری ندارد
کامل وکشت ادرار	*			مثبت
گرافی خوابیده و ایستاده شکم		*		منفی
سونوگرافی شکم				اثری ندارد
بلع باریم		*		منفی
آندوسکوپی فوقانی گوارش		*		منفی

یافته های غیر طبیعی در بررسی های پاراکلینیک شیرخوار وجود ندارد. ضروری ترین اقدامات درمانی کدام یک از موارد زیر می باشند؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
مایع درمانی وریدی		*		منفی
اصلاح نحوه شیردهی	*			مثبت
شروع شیر خشک AR		*		منفی
حذف شیرگاو از رژیم مادر				اثری ندارد
شروع غذای کمکی				اثری ندارد
اصلاح پوزیشن شیرخوار	*			مثبت
تجویز متوکلوپرامید		*		منفی
تجویز دومپریدون		*		منفی
پیگیری وزن گیری	*			مثبت