

عفونی و ریه

این سوال سه قسمت دارد

شیرخوار ۴ ماهه با سن جنینی ۳۴ هفته، در اوایل دی ماه با علائم تب، سرفه و بی حالی از سه روز قبل به اورژانس آورده شده است. سابقه آسم و آلرژی در خانواده و شواهد آتوپی در وی وجود ندارد. تعداد تنفس ۷۴، ضربان قلب ۱۴۰ در دقیقه و درجه حرارت ۳۸°C است. رتاکشن بین دنده‌ای دارد و ویزینگ منتشر همراه با کراکل در قاعده ریه‌ها شنیده می‌شود. کبد ۳ سانتی‌متر زیر دنده با span طبیعی لمس می‌شود. سابقه بستری قبلی نداشته است. وزن‌گیری مناسب است.

مهم‌ترین اقدامات در این مرحله را مشخص کنید.

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
رادیوگرافی قفسه سینه	*			مثبت
اندازه‌گیری تروپونین				اثری ندارد
اندازه‌گیری CRP	*			مثبت
CBC و WBC diff	*			مثبت
تست عرق				اثری ندارد
ارزیابی پالس اکسیمتری	*			مثبت
اکوکاردیوگرافی				اثری ندارد
سی تی اسکن ریه	*			منفی
اسپیرومتری	*			منفی
اولتراسونوگرافی شکم و لگن	*			منفی

درصد اشباع اکسیژن ۸۸ درصد است. تعداد لکوسیت خون محیطی ۱۲۰۰۰ در میلی لیتر مکعب با ارجحیت لنفوسیت است. CRP منفی است. رادیوگرافی قفسه سینه بیمار را مشاهده می کنید. اقدامات درمانی مهم تر در این مرحله را مشخص نمایید.



(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
اکسیژن با جریان بالا از طریق کانول بینی	*			مثبت
متیل پردنیزولون وریدی		*		منفی
نبولایز سالین هایپرتونیک ۳٪				اثری ندارد
سفتریاکسون وریدی		*		منفی
نبولایز مکرر اپی نفرین راسمیک				اثری ندارد
نبولایز بودزوناید				اثری ندارد
تخلیه ترشحات بینی	*			مثبت
فیزیوتراپی مکرر قفسه سینه				اثری ندارد
مایع درمانی مناسب	*			مثبت
آزیترومایسین				اثری ندارد

PCR ویروس سندشیال ترشحات تنفسی مثبت گزارش شد. بیمار تحت درمان حمایتی قرار گرفت. با بهبود وضعیت عمومی پس از چهار روز ترخیص می‌شود. اقدامات و توصیه‌های در زمان ترخیص را مشخص نمایید؟

(محدودیت انتخاب: 2 گزینه – انتخاب گزینه غلط، نمره منفی دارد)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
واکسن آنفلوآنزا برای شیرخوار		*		منفی
واکسن آنفلوآنزا برای سایر اعضای خانواده	*			مثبت
ویتامین D روزانه 1000 واحد				اثری ندارد
بودزونايد استنشاقی				اثری ندارد
ویتامین A با دوز ۵۰۰۰۰ IU		*		منفی
توصیه به استفاده از شیر مادر	*			مثبت
تکرار رادیوگرافی قفسه سینه یک هفته بعد		*		منفی
تکرار CBC یک هفته بعد				اثری ندارد