

تومورهای گوش میانی

نمره سوال: 4

خانم پنجاه و شش ساله‌ای با سابقه ده ماهه pulsatile tinnitus یک‌طرفه و کاهش شنوایی تدریجی در گوش راست مراجعه می‌کند. در اوتوسکوپی یک توده قرمز عروقی در پشت پرده تمپان مشاهده می‌شود که پرده را به طرف بیرون هل داده است. CT scan استخوان تمپورال، تخریب استخوانی در ناحیه فورامن ژوگولار راست را نشان می‌دهد.

بهترین اقدام بعدی در مدیریت این بیمار کدام است؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - بدون نمره منفی)

(4 مورد را انتخاب کنید)

2.00	درخواست آزمایش ادرار ۲۴ ساعته برای اندازه‌گیری متانفرین و کاتکول آمین‌ها
2.00	درخواست آنژیوگرافی تشخیصی با آمبولیزاسیون انتخابی
2.00	برنامه‌ریزی برای جراحی از طریق رویکرد اینفراتمپورال (Fisch Type A)
0.00	برنامه‌ریزی برای جراحی از طریق رویکرد ساب‌اکسیپیتال
0.00	بیوپسی از توده از طریق پرده گوش برای تأیید تشخیص
2.00	درخواست MRI
0.00	ارجاع به جراح مغز و اعصاب
0.00	شروع کورتیکواستروئید خوراکی برای کاهش ادم اطراف توده
0.00	درخواست مشاوره با متخصص گوارش برای بررسی دیسفاژی
0.00	برنامه‌ریزی برای رادیوتراپی خارجی به‌عنوان درمان اولیه
0.00	درخواست سونوگرافی گردن برای بررسی غدد لنفی
0.00	برنامه‌ریزی برای جراحی از طریق مجرای گوش (Transcanal)