


جراحی گوش و حلق و بینی و سرو گردن

بیمار خانم ۳۶ ساله‌ای با شکایت از توده بدون درد گردن در زیر لوبول گوش چپ از یک سال قبل با رشد تدریجی مراجعه کرده است.



در شرح حال و معاینه، کدامیک از موارد زیر حائز اهمیت است؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

مدت آزمون: 10	آزمون: 09- گوش حلق بینی- PMP
---------------	------------------------------


مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	1.00	ندارد	سابقه رادیوتراپی
	0.00	0.00	اهمیت ندارد	سابقه مصرف الکل
	0.00	0.00	اهمیت ندارد	سابقه خانوادگی تومور غدد بزاقی
	0.00	1.00	سابقه مصرف سیگار دارد	سابقه مصرف سیگار
	0.00	0.00	اهمیت ندارد	سابقه زگیل تناسلی
	0.00	1.00	نرمال است	معاینه سمت مقابل
	0.00	1.00	نرمال است	معاینه عصب فاسیال
	0.00	1.00	چسبندگی ندارد	چسبندگی توده به پوست یا بافت‌های عمقی
	0.00	0.00	نرمال است ولی در بررسی توده اهمیتی ندارد	بررسی مجرای Stensen و ترشح بزاق

توده بدون درد در قطب تحتانی پاروتید چپ با قوام Firm و فاقد چسبندگی به بافت زیرین و پوست است. معاینه دهان و حلق و گردن نکته خاصی ندارد. کدام اقدامات زیر را انتخاب می‌کنید؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	سی تی اسکن پاروتید بدون تزریق
	0.00	0.00	با توجه با اینکه می توان از مدالیتته های تشخیصی دقیق تر استفاده کرد، ضرورتی ندارد	سی تی اسکن پاروتید با تزریق
	0.00	1.50	یک توده هیپواکو لوبوله به ابعاد تقریبی 23 در 16 میلی متر در قطب تحتانی پاروتید چپ و دارای واسکولاریته اندک با Posterior acoustic enhancement	سونوگرافی
	0.00	1.50	در تشخیص کمک کننده است	MRI پاروتید
	0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	سیالوگرافی
	0.00	0.00	اندیکاسیون ندارد	سی تی سیالوگرافی
	0.00	0.00	کمکی نمی کند	ESR , CBC
	0.00	1.00	نتیجه سیتولوژی: Atypia of Undetermined Significance	FNA

با توجه به تصاویر MRI کدام مورد زیر صحیح تر است؟




(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

مرگ	عدم انتخاب	نمره انتخاب	بازخورد	گزینه
	0.00	0.00	صحیح نیست	لنفادنوپاتی
	0.00	0.00	صحیح نیست	malignancy
	0.00	0.00	صحیح نیست	perineural spread

	0.00	0.00	صحیح نیست	Metastasis
	0.00	1.50	صحیح است	Benign Neoplasm
	0.00	0.00	صحیح نیست	کیست برانکیال تیپ ۱

با توجه به یافته‌های MRI و FNA، بهترین اقدام برای این بیمار چیست؟



جواب FNA به صورت Non diagnostic گزارش شده است.

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
تحت نظر گرفتن و فالوآپ	صحیح نیست	0.00	0.00	
بیوپسی انسزیونال	صحیح نیست	0.00	0.00	
پیگیری از نظر متاستاز با پت اسکن	صحیح نیست	0.00	0.00	
سوپرفیشیال پاروتیدکتومی	صحیح است	1.50	0.00	
توتال پاروتیدکتومی	صحیح نیست	0.00	0.00	