


بیماری های گوش گلو بینی ترومای حنجره

آقای ۳۰ ساله، ۲ روز بعد از ترومای بلانت به گردن با شکایت گرفتگی صدا مراجعه کرده است.

کدام یک از اقدامات زیر در این مرحله اولویت دارد؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)


آزمون: 10_ گوش حلق بینی_PMP	مدت آزمون: 10
-----------------------------	---------------

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
بررسی گردن از نظر وجود زخم و پارگی	علائمی ندارد	1.00	0.00	
بررسی بیمار از نظر وضعیت راه هوایی	Stable است	2.00	0.00	
انجام فرمول شمارش و تست های انعقادی	نیازی نیست	0.00	0.00	
ویدئو آندوسکوپی حنجره		2.00	0.00	
CT scan گردن	در این مرحله اندیکاسیون ندارد	0.00	0.00	
سونوگرافی داپلر عروق گردن	در این مرحله اندیکاسیون ندارد	0.00	0.00	
آنژیوگرافی عروق گردن	در این مرحله اندیکاسیون ندارد	0.00	0.00	
آندوسکوپی تراشه و مری	در این مرحله اندیکاسیون ندارد	0.00	0.00	
بستری بیمار در بخش مراقبت های ویژه	نیازی نیست	0.00	0.00	

با توجه به یافته های معاینه حنجره، کدام اقدام زیر را انتخاب می کنید؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
بستری در بخش مراقبت های ویژه	نیازی نیست	0.00	0.00	

		AMIRALAM HOSPITAL 1 Neck 0.75 B20s SE: 3 IM: 161 of 300 -379.9 512 * 512 B20s 29YR^96/07/29 MB AGE: 29Y M 3015105 Study Date: 1396/07/29 Image Time: 18:15:19 	انجام CT scan گردن
0.00	5.00	AMIRALAM HOSPITAL 1 Neck 5.0 B50s SE: 2 IM: 26 of 43 -390.8 512 * 512 B50s 29YR^96/07/29 MB M 3015105 Study Date: 1396/07/29 Image Time: 18:15:20 	
0.00	0.00	تاثیری ندارد	درمان با استروئید تزریقی
0.00	0.00	نیازی نیست	درمان با آنتی بیوتیک وریدی
0.00	1.00	انجام شد	درمان با مهارکننده پمپ پروتون
0.00	0.00	نیازی نیست	اکسپلور گردن

پیگیری به صورت سرپایی	اشتباه است	0.00	0.00
-----------------------	------------	------	------

در تقسیم‌بندی SCHAEFER-FUHRMAN بیمار در کدام گروه قرار می‌گیرد؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
گروه ۱	نادرست	0.00	0.00	
گروه ۲	نادرست	0.00	0.00	
گروه ۳	درست	5.00	0.00	
گروه ۴	نادرست	0.00	0.00	
گروه ۵	نادرست	0.00	0.00	

با توجه به یافته‌های موجود، چه اقدامی باید انجام داد؟

(محدودیت انتخاب: 1 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	بازخورد	نمره انتخاب	عدم انتخاب	مرگ
تحت نظر گرفتن و درمان با استروئید و آنتی‌بیوتیک	اشتباه است	0.00	0.00	
تراکتوستومی لوکال	تیازی نیست	0.00	0.00	
فیکساسیون غضروف	صحیح است	5.00	0.00	
ریداکشن مفصل کریکواآریتنویید	نیازی نیست	0.00	0.00	
ترمیم اندولارنکس و استفاده از stent به مدت ۲ هفته	نیازی نیست	0.00	0.00	