

دفرمیتی و مشکل تنفسی بعد از جراحی بینی

خانم ۴۲ ساله‌ای به دلیل دفرمیتی و اشکال تنفسی به دنبال ۳ جراحی قبلی بینی به شما مراجعه کرده است. فوتوگرافی وی ضمیمه می‌باشد.



در تاریخچه اخذ شده، کدامیک از نکات زیر به تشخیص شما کمک بیشتری می‌کند؟

(محدودیت انتخاب: 4 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
فواصل انجام جراحی‌ها	*			مثبت
نام جراح‌های قبلی				اثری ندارد
سابقه خروج چرک از داخل بینی	*			مثبت
سابقه سینوزیت حاد				اثری ندارد
سابقه استفاده از غضروف از ناحیه دیگر	*			مثبت
سابقه انجام سایر جراحی‌های صورت				اثری ندارد
مدت باقی ماندن اسپلینت خارجی در جراحی قبلی				اثری ندارد
مدت چسب زدن بعد از آخرین جراحی				اثری ندارد
سابقه استفاده از پماد انتی اسکار				اثری ندارد
سابقه مصرف مکمل‌های گیاهی				اثری ندارد
مصرف مشروبات الکلی				اثری ندارد
استفاده از تامپون در جراحی قبلی				اثری ندارد
تاریخ آخرین جراحی	*			مثبت
انجام جراحی در بیمارستان یا کلینیک				اثری ندارد
انجام جراحی‌های قبلی تحت بیهوشی عمومی یا موضعی				اثری ندارد

در شرح حال سابقه چندین بار تزریق فیلر در بینی وجود دارد و در معاینه رینوسکوپی قدامی، سپتوم دارای انحراف بوده ولی انسداد تنفسی ایجاد نکرده است. با قرار دادن اسپکولوم بینی، بیمار احساس راحتی بیشتری در تنفس می‌کند. در معاینه ظاهری یک قطعه متحرک بر روی دورسوم بینی و پوست اتروفیک لمس می‌گردد. انجام کدامیک از گزینه‌های زیر کمک بیشتری در تشخیص مشکل تنفسی و ظاهری وی می‌نماید؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
تست کاتل				اثری ندارد
تست کاتل مدیفیه	*			مثبت
سونوگرافی بینی	*			مثبت
مشاوره پوست				اثری ندارد
مشاوره عفونی				اثری ندارد
سی تی اسکن دنده	*			مثبت
ام آر ای با تزریق				اثری ندارد
رینومانومتري				اثری ندارد
اسپیرومتری				اثری ندارد
ESR,CRP				اثری ندارد
مشاوره روماتولوژی				اثری ندارد
اسپیراسیون دورسوم با سوزن				اثری ندارد

در مراجعه کننده فوق، کدام دفرمیتی های زیر وجود دارد؟

(محدودیت انتخاب: 2 گزینه - بدون نمره منفی)

وضعیت نمره	خطای فاحش	گزینه نادرست	گزینه صحیح	گزینه
اثری ندارد				Inverted v deformity
اثری ندارد				Pollybeak deformity
مثبت			*	Cartilaginous saddle deformity
اثری ندارد				Underrotated Tip
اثری ندارد				High Radix
اثری ندارد				Boxy Tip
مثبت			*	Underprojected Tip
اثری ندارد				Overresected Alar Sill
اثری ندارد				Hanging Columella
اثری ندارد				Hanging Ala
اثری ندارد				Wide Dorsum

پس از بررسی‌های لازم تصمیم به جراحی مجدد وی می‌گیرید. شرح حال چندین بار خروج چرک از داخل بینی و تورم و قرمزی دورسوم بینی را ذکر می‌کند. انجام کدامیک از تکنیک‌های زیر برای این بیمار مناسب‌تر است؟

(محدودیت انتخاب: 3 گزینه - بدون نمره منفی)

گزینه	گزینه صحیح	گزینه نادرست	خطای فاحش	وضعیت نمره
قرار دادن غضروف چند لایه دنده در زیر پوست دورسوم				اثری ندارد
قرار دادن غضروف گوش بدون پریکوندریوم در زیر دورسوم				اثری ندارد
استفاده از DCF (Diced Cartilage in Fascia)	*			مثبت
تزریق چربی نانو در فاسیا و یا زیر پوست بعد از گذاشتن گرافت دورسوم	*			مثبت
استفاده از SEG الیوگرافت				اثری ندارد
تزریق هیالاز یک هفته بعد از جراحی				اثری ندارد
استفاده از شیلد گرافت به تنهایی				اثری ندارد
استفاده از Free Diced به تنهایی روی دورسوم				اثری ندارد
استفاده از گانتر بدون ریپوزیشن				اثری ندارد
استفاده از الیوگرافت دورسوم				اثری ندارد
استفاده از غضروف دنده (Dynamic Adjustable Rotational Tip Graft (DART)	*			مثبت
استفاده مجدد از پروتز مدپور دورسوم				اثری ندارد
Lat. Crural Cut & overlap				اثری ندارد
Med. Crural Cut & overlap				اثری ندارد